

INFORME COPAC

2023/2024

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o Medioambientales (COPAC)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística



Seguimiento COPAC 2024 – Impacto en el sector agrario

Índice

03 Resumen Ejecutivo

04 Situación Meteorológica

08 Hidrología

14 Avances de Superficies y
Producciones de Cultivos

18 Información Adicional

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN

Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística
sgapc@mapa.es



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Edita

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones
Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
<https://cpage.mpr.gob.es/>

NIPO: 003-24-002-3



1. RESUMEN EJECUTIVO

- **Año hidrológico 2023/2024. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas** (en el periodo del 1 de octubre de 2023 al 24 de septiembre de 2024) **ha sido de 660,4 mm, un 5,1% superior al valor normal.** La Precipitación media nacional normal para ese período es de 628,6 mm. La semana pasada fue superior en un 3,8%, hace un año fue inferior en un 11,3% y hace dos años inferior en un 25,6%.
- **Las reservas bajan ligeramente con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo)** se sitúa en un 39,7% de su capacidad (15.416 hm³), valor inferior a la semana anterior (39,9 %), valor superior al año pasado (27,8%), superior a la media de los últimos 5 años (33,5%) e inferior a la media de los últimos 10 años (40,8%).
- Como se puede ver en el informe [\(apartado 4\)](#) **con datos a 30 de junio**, la estimación provisional de superficie sembrada de cereales de otoño-invierno para la campaña de comercialización 2024-25, presenta un ascenso del 1 % respecto a la campaña precedente. En cuanto a las estimaciones de las producciones de la cosecha 2024 de todo el grupo en su conjunto, se ha alcanzado la cifra de 16.355 toneladas, lo que supone un aumento del 87,8 % respecto a la campaña 2023 y se encuentran en línea con la media de las últimas cinco campañas. Entre los cereales de primavera, las estimaciones de producción de la cosecha 2024 para el maíz, registran un descenso del 3,9 % y de un 4,3 % en su superficie respecto a la cosecha 2023. En cuanto al arroz, las estimaciones tanto de superficie (47,9 %) como de producción (73,4 %), son superiores a los datos de la campaña pasada y se encuentran en línea con la media de las últimas campañas. Las estimaciones de producciones de leguminosas grano muestran importantes aumentos, tanto respecto a la última campaña como a la media de las anteriores, con incrementos superiores al 100% respecto a la campaña pasada en yeros, lentejas y vezas, y del 73% en garbanzos.

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA




2.1. PRECIPITACIONES Año hidrológico 2023/2024


Año hidrológico 2023/2024. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 de octubre de 2023 al 24 de septiembre de 2024) **ha sido de 660,4 mm, un 5,1% superior al valor normal.** La Precipitación media nacional normal para ese período es de 628,6 mm. La semana pasada fue superior en un 3,8%, hace un año fue inferior en un 11,3% y hace dos años inferior en un 25,6%.

Con datos finales de la AEMET, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico 2022-2023, se situó en 561 mm en la Península, un 12% menos de lo normal en el periodo de referencia 1991-2020, que son 640 mm.


Mapa 1. Semana actual



Mapa 2. Hace una semana.



Mapa 3. Hace un año



Mapa 4: Hace 2 años



INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI en sus siglas en inglés)


El SPI (Standardized Precipitation Index), es un índice que permite cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y, en base a ello, poder evaluar el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos. La clasificación de los periodos de sequía en distintas categorías o intensidades fue señalada por McKee en 1993 y posteriormente refinada por Agnew* en el año 2000. La clasificación, es de gran utilidad para determinar los espacios que están sufriendo más sequía y clasificarla en diferentes grados. Por ejemplo, un valor de SPI, para un periodo determinado, de -2,3 indicaría que la cantidad de precipitación que se registrada en ese periodo se ha situado a 2,3 veces la desviación estándar por debajo del valor medio.

SPI	CATEGORÍA
≥ 1.65	Extremadamente húmedo
1.28 a 1.64	Severamente húmedo
0.84 a 1.27	Moderadamente húmedo
-0.83 a 0.83	Normal
-1.27 a -0.84	Moderadamente seco
-1.64 a -1.28	Severamente seco
≤ -1.65	Extremadamente seco

La teoría de Agnew refinó los valores de umbrales de sequía en 2020.:



12 meses (acumulado año agrícola)			
A CORUÑA	1.65	JAEN	-0.12
ALBACETE	-1.40	LA RIOJA	1.02
ALICANTE	-2.47	LAS PALMAS	-1.45
ALMERIA	-2.23	LEON	0.60
ARABA/ALAVA	0.20	LLEIDA	-0.54
ASTURIAS	-0.51	LUGO	1.33
AVILA	1.15	MADRID	1.38
BADAJOS	0.40	MALAGA	-1.43
BALEARES	-1.46	MELILLA	-1.62
BARCELONA	-1.09	MURCIA	-2.03
BIZKAIA	0.01	NAVARRA	0.65
BURGOS	0.37	OURENSE	1.31
CACERES	0.96	PALENCIA	0.58
CADIZ	-0.77	PONTEVEDRA	1.78
CANTABRIA	-0.81	SALAMANCA	0.63
CASTELLON	-1.88	STA CRUZ TENERIFE	-1.54
CEUTA	-0.23	SEGOVIA	2.06
CIUDAD REAL	0.33	SEVILLA	0.05
CORDOBA	0.11	SORIA	1.50
CUENCA	0.08	TARRAGONA	-1.38
GIPUZKOA	0.18	TERUEL	-1.12
GIRONA	-1.42	TOLEDO	1.49
GRANADA	-0.69	VALENCIA	-1.72
GUADALAJARA	1.23	VALLADOLID	0.92
HUELVA	-0.01	ZAMORA	0.51
HUESCA	0.49	ZARAGOZA	0.33




NOTA: Los datos numéricos de SPI de agosto, figuran en el ANEXO 1 del informe COPAC.

2.1. Evolución mensual de las precipitaciones Años hidrológicos 2018/19 a 2023/24.

Año hidrológico	AÑO HIDROLÓGICO													
	VALOR NORMAL DE REFERENCIA (1991-2020)		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/2023		2023/2024	
	Precipitación normal mensual	Precipitación	% respecto valor medio mensual	Precipitación	% respecto valor medio mensual	Precipitación	% respecto valor medio mensual	Precipitación	% respecto valor medio mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	
	640,1 mm	585 mm	-12,9%	505 mm	-13%	606 mm	-5%	473 mm	-26%	561 mm	-12%	560 mm		
Octubre	77,8 mm	98 mm	25,6%	63 mm	-19%	69 mm	-12%	57 mm	-27%	52 mm	-33%	105 mm	35%	
Noviembre	78,1 mm	106 mm	32,5%	119 mm	49%	69 mm	-14%	56 mm	-30%	64 mm	-20%	71 mm	-9%	
Diciembre	73,3 mm	28 mm	-65,9%	112 mm	37%	74 mm	-10%	62 mm	-24%	118 mm	43%	33 mm	-54%	
Enero	64,5 mm	55 mm	-14,1%	64 mm	0%	64 mm	0%	16 mm	-75%	60 mm	-7%	68 mm	5%	
Febrero	51,5 mm	15 mm	-71,7%	13 mm	-75%	71 mm	34%	11 mm	-79%	17 mm	-67%	70 mm	35%	
Marzo	59,4 mm	26 mm	-44,7%	92 mm	96%	17 mm	-64%	104 mm	121%	21 mm	-64%	120 mm	102%	
Abril	63,5 mm	96 mm	47,7%	91 mm	40%	63 mm	-2%	67 mm	3%	14 mm	-78%	32 mm	-50%	
Mayo	56,8 mm	24 mm	-60,7%	54 mm	-11%	34 mm	-44%	20 mm	-67%	60 mm	6%	38 mm	-34%	
Junio	32,0 mm	18 mm	-41,9%	34 mm	10%	50 mm	61%	19 mm	-39%	67 mm	110%	48 mm	49%	
Julio	16,8 mm	24 mm	20,0%	14 mm	-30%	10 mm	-50%	9 mm	-57%	10 mm	-41%	10 mm	-39%	
Agosto	21,7 mm	23 mm	0,0%	27 mm	17%	16 mm	-30%	22 mm	-5%	10 mm	-53%	24 mm	12%	
Septiembre*	44,7 mm	52 mm	15,6%	34 mm	-24%	59 mm	31%	36 mm	-33%	67 mm	51%	42 mm	-6%	

*datos provisionales a 24 de septiembre

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el periodo 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17)



*Dato provisional a 23 de septiembre

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.2. Distribución territorial (principales observatorios de AEMET).


Figura 5. Precipitaciones del 1 de octubre de 2023 al 23 de septiembre de 2024

ESTACIÓN (AEMET)	Período del 01/10/2023-24/09/2024			Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) de la semana anterior (%)
	Precipitación Acumulada desde 01/10/2023	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) (mm)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020)(%)	
TOTAL GALICIA	1.717,1	461,9	36,8%	37,5%
TOTAL ASTURIAS	1.049,0	33,0	3,2%	3,9%
TOTAL CANTABRIA	1.132,9	47,6	4,4%	5,7%
TOTAL PAIS VASCO	1.486,1	218,6	17,2%	15,3%
TOTAL CASTILLA Y LEON	557,9	97,2	21,1%	19,2%
TOTAL LA RIOJA	565,9	139,5	32,7%	27,5%
TOTAL NAVARRA	932,6	241,0	34,8%	33,5%
TOTAL ARAGÓN	449,4	66,7	17,4%	12,0%
TOTAL CATALUÑA	441,9	-66,0	-13,0%	-16,2%
TOTAL MADRID	626,6	72,5	13,1%	11,5%
TOTAL CASTILLA LA MANCHA	456,2	60,8	15,4%	8,7%
TOTAL EXTREMADURA	615,1	144,6	30,7%	32,3%
TOTAL VALENCIA	166,4	-191,2	-53,5%	-60,2%
TOTAL BALEARES	346,5	-102,6	-22,8%	-25,6%
TOTAL ANDALUCÍA	398,6	-66,4	-14,3%	-13,1%
TOTAL MURCIA	134,8	-148,8	-52,5%	-54,0%
TOTAL CANARIAS	100,0	-110,5	-52,5%	-52,3%
CEUTA	593,4	-136,0	-18,6%	-17,7%
MELILLA	126,0	-239,9	-65,6%	-66,8%
Media Nacional	660,4	31,8	5,1%	3,8%

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.3. Agosto

El mes de agosto fue en conjunto extremadamente cálido, con una temperatura media sobre la España peninsular de 25,0 °C. Este valor queda 2,0 °C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020). Se trató del agosto más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando en 0,2 °C a los



agostos de 2003 y 2023, que eran hasta ahora los más cálidos de la serie. El mes de agosto fue húmedo, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 24,2 l/m², lo que representa el 112 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Agosto tuvo carácter muy húmedo en gran parte de Aragón, en Navarra, La Rioja, País Vasco, este de Castilla y León, Madrid y noroeste de Castilla-La Mancha, donde llegó a ser extremadamente húmedo. En el resto de la Península fue entre normal y húmedo, salvo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y el noroeste de Andalucía, donde fue seco o muy seco. En Baleares fue, en conjunto, muy húmedo, mientras que fue húmedo en Canarias.

2.4. Predicción estacional de la AEMET.

La predicción de anomalías en el trimestre **septiembre-octubre-noviembre** en la península y ambos archipiélagos es la siguiente:

- **Precipitación**, hay una mayor probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil seco en toda España, salvo en el noreste peninsular donde la probabilidad de los terciles es la climatológica. (Periodo de referencia 1991-2020).
- **Temperatura**, hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España. (Periodo de referencia 1991-2020).

3. HIDROLOGÍA



3.1. RESERVAS USO CONSUNTIVO. AÑO HIDROLOGICO 2023/2024. Datos de la semana del 18 al 23 de septiembre de 2024.


Fuente: Dirección General del Agua MITERD

- Las reservas bajan con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 39,7% de su capacidad (15.416 hm³), valor inferior a la semana anterior (39,9 %), valor superior al año pasado (27,8%), superior a la media de los últimos 5 años (33,5%) e inferior a la media de los últimos 10 años (40,8%). Las reservas del Segura, Guadiana, Guadalquivir y Cuencas Internas de Cataluña son inferiores en 16; 4,6; 9,3 y 33,5 puntos porcentuales respectivamente respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 16,3%, las del Guadiana se sitúan en un 39,6%, en el Guadalquivir están al 30,7% y en las cuencas Internas de Cataluña están al 29,2%.

TRASVASE TAJO SEGURA

- Los embalses de la cabecera del Tajo, **Entrepeñas y Buendía**: capacidad conjunta de 1011 hm³. Autorizado un trasvase de 27 hm³ en septiembre.

Evolución reservas de uso consuntivo.




Reservas (uso consuntivo) por cuencas

ÁMBITOS	hm ² ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	60	82,2	82,2	72,3	70,1
Cantábrico Occidental	38	82,6	78,3	72,6	68,8
Miño - Sil	195	53,9	58,6	47,6	43,6
Galicia Costa	59	74,7	67,1	69,6	69,9
Cuencas Internas del País Vasco	19	90,5	66,7	68,6	67,1
Duero	1.400	48,1	31,8	37,3	39,0
Tajo	2.782	48,1	31,9	32,6	33,8
Guadiana	3.781	39,6	23,8	29,3	44,3
Tinto, Odiel y Piedras	165	72,1	55,0	63,1	67,0
Guadalete-Barbate	349	21,1	16,0	31,1	45,2
Guadalquivir	2.450	30,7	18,3	26,6	40,0
Vertiente Atlántica	11.298	39,4	25,3	30,9	40,8
Cuenca Mediterránea Andaluza	274	23,3	24,0	39,8	43,2
Segura	185	16,3	24,3	32,4	32,3
Júcar	1.051	39,0	46,0	44,0	36,3
Ebro	2.410	54,2	34,9	39,0	43,0
Cuencas Internas de Cataluña	198	29,2	22,6	54,6	62,7
Vertiente Mediterránea	4.118	40,7	34,6	40,6	40,9
TOTAL PENINSULAR	15.416	39,7	27,8	33,5	40,8

AGUA EMBALSADA: 39,7 %

% Capacidad de reservas (uso consuntivo) por cuencas con respecto a la media de los últimos 10 años



3.2. INDICADORES DE ESTADO DE SEQUÍA

A finales de julio de 2024, la situación de los **indicadores de sequía prolongada** es la que se muestra en el Mapa.



A continuación, se representan, por su posible incidencia en el sector agrario, **los mapas de escasez coyuntural de los meses de junio y julio.**

A fecha 31 de julio de 2024

A fecha 30 de junio de 2024



Situación de los indicadores de Escasez Coyuntural por cuencas a finales de julio de 2024:

Los primeros meses del año hidrológico 2023/24 permitieron superar la situación de escasez que se arrastraba en zonas como la cuenca del Duero, o en la mayor parte de la cuenca del Ebro. En otras zonas (Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura, cuencas intracomunitarias de Andalucía y de Cataluña) se mantuvo el carácter seco, agudizándose los problemas de sequía y escasez. Las importantes lluvias iniciadas en marzo en buena parte de la Península supusieron un alivio importante, con notables mejorías en zonas de Guadiana, Guadalquivir y en la parte más occidental de las cuencas intracomunitarias andaluzas. Estas lluvias no han sido relevantes en Júcar y Segura, mientras que en las cuencas intracomunitarias de Cataluña, muy castigadas por una secuencia de varios años extremadamente secos, las lluvias llegaron en abril y mayo, e incluso se han mantenido durante el mes de junio. Aunque la situación de escasez aún no puede considerarse solucionada, la mejoría ha supuesto un claro alivio respecto a las muy negativas expectativas existentes en las cuencas catalanas hace unos meses.

A modo de resumen de la situación respecto a la escasez coyuntural, a finales de julio las UTE en escenario de Emergencia son 16, una más que el mes anterior. Estas UTE corresponden a: Cuencas Mediterráneas Andaluzas (5), Júcar (4), Guadiana (3), Segura (2) y Cuencas internas de Cataluña (2).

Hay 6 Unidades de Explotación en las Cuencas internas de Cataluña en situación de Excepcionalidad (situación intermedia a las de Alerta y Emergencia), y 30 UTE en escenario de Alerta (6 en Guadalquivir y en Cuencas internas de Cataluña, 5 en Ebro y en Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 3 en Júcar, 2 en Gadiana y en Guadalete-Barbate, y 1 en Duero). Geográficamente, el 6,4% del territorio está situado en UTE en escenario de Emergencia, mientras que el 17,7% se encuentra en Excepcionalidad o Alerta ([Ver Mapa](#)).

Impactos económicos en agricultura y ganadería:

- **Demarcación del Gadiana. Uso agrario de regadío.** Dada la mejoría de la situación, se espera que los riegos regulados de origen superficial de los Sistemas Oriental, Occidental y Ardila sean atendidos con normalidad. No se ha producido mejoría sensible en las UTE con riegos de origen subterráneo desde masas en riesgo (Mancha Occidental I, Gigüela-Záncara y Alange Barros), en los que se ha establecido, al igual que en campañas anteriores, el ajuste de las extracciones a través de los Regímenes Anuales de Extracción (RAE), aprobados por la Junta de Gobierno en el mes de diciembre, por lo que se prevé el mantenimiento de esta medida.
- **Demarcación del Guadalquivir. Regadío:** El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir aprobó en la sesión del 24 de abril un desembalse de 1.010 hm³ para el riego de los cultivos del Sistema de Regulación General (SRG) durante la campaña 204, que comenzó el 25 de abril y se extenderá hasta el 30 de septiembre, y además se prevé una dotación complementaria de 30 hm³ para los cultivos de octubre. Este volumen supone un aumento del 162% respecto a lo asignado para la campaña 2023 (385 hm³). También se acordó una reducción del 33% en las dotaciones, que será así de un máximo de 4.000 m³ por hectárea para los cultivos de mayor consumo de agua. Para el resto de los cultivos, la restricción será proporcional y progresiva atendiendo a sus dotaciones concesionales. La reducción de la campaña del año pasado fue del 88%. Para el riego del arroz se ha aprobado un volumen máximo a desembalsar de 264 hm³, tras no haberse podido sembrar en 2023 y haberlo hecho solo en un 30% en 2022. Además, en el resto de sistemas de explotación se han acordado dotaciones que oscilan desde los 1.200 m³/ha hasta los 5.000 m³/ha, dependiendo de los volúmenes almacenados en cada sistema. La situación de escasez en aquellas UTE con demandas de riego a fecha 31 de julio es la siguiente:
 - Normalidad: Madre de las Marismas, Fresneda y Rumbiar.
 - Prealerta: Guadiamar, Bermejales, Vega Alta y Media de Granada, Vega Baja de Granada, Guadalentín, Viar y Bembézar-Retortillo.
 - Alerta: Hoya de Guadix, Regulación General, Guardal y Guadalmeñato.
 - Emergencia: Ninguna UTE.

Actualmente, la superficie de regadío abastecida con aguas reguladas afectada por una situación de Alerta es del 85,7%, mientras que se encuentra en Prealerta el 13% de la superficie regable con aguas reguladas de la cuenca.

La transferencia de recursos desde el Negratín al Almanzora sigue sin ponerse en marcha porque no se cumplen las condiciones que establece la legislación que la regula.

Por otra parte, se continúan incorporando al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) nuevas hectáreas para que se puedan constatar a tiempo real y mediante la implementación de equipos de telemetría en los contadores de las comunidades de regantes, los consumos que se realizan en ellas. El 77% de las hectáreas del Sistema de Regulación General están ya incluidas en la red de señales del SAIH.

- **Demarcación del Segura.** El índice de escasez del subsistema Cuenca tiene actualmente un valor de 0,271 (valor parcial de Alerta), mientras que el del subsistema Trasvase tiene un valor de 0,838 (valor parcial de Normalidad). Como consecuencia de ambos valores el indicador de la UTE Principal y del Global de la Demarcación se sitúa en un valor de 0,555, que corresponde a un valor de Normalidad. Las UTE Ríos Margen Izquierda y Ríos Margen Derecha se mantienen en escenario de Emergencia, por lo que a las restricciones ya establecidas en noviembre de 2023 para el sistema principal (Segura-Mundo-Quípar), se añaden restricciones en la UTE de Ríos Margen Derecha: Moratalla, Argos, Quípar y Guadalentín aguas arriba del embalse de Puentes, así como en las masas de agua subterránea Anticlinal de Socovos, Caravaca, Alto Quípar, Bajo Quípar, Detrítico de Chirivel, Vélez Blanco-María, Valdeinferno y Sierra de la Zarza. Por otro lado, para la UTE Ríos Margen Izquierda no se aplican restricciones por no existir en la actualidad fuentes y manantiales en explotación, ni cauces por los

que discurran caudales con carácter permanente, si bien no puede descartarse que se hayan de adoptar medidas de limitación temporal en la utilización de los volúmenes actualmente otorgados.

Las actuaciones administrativas más reseñables son las siguientes:

- Se publicó en el BOE de 28/5/2024 la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto “Explotación temporal de la batería de pozos de sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura en Hellín para abastecimiento” destinada a abastecimiento de población para municipios atendidos por la mancomunidad de Canales del Tabilla (MCT) y para el municipio de Hellín. Con un volumen máximo de extracción es de 13,27 hm³/año durante cuatro años hasta un máximo de 53,08 hm³.
 - La Comisión de Desembalse de la CH del Segura aprobó por unanimidad en el pasado mes de noviembre una reducción de 33 hm³ para los aprovechamientos de los regadíos no tradicionales de los ríos Segura, Mundo y Quípar, y un descenso de 37 hm³ para los regadíos tradicionales. Esto supone una reducción media del 25%.
 - Se publicó en el BOE del 22 de diciembre del pasado año la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación temporal de la batería de pozos de sequía en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., en el acuífero Sinclinal de Calasparra”.
- La extracción anual prevista a través de nueve pozos de sequía en dicho acuífero es de 31,88 hm³. Se encuentra en tramitación ambiental la puesta en marcha de otros sondeos de la Batería Estratégica de Sondeos (BES) de la Confederación.
- A través del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, se introdujeron medidas para paliar los efectos de la sequía en diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Segura. Las medidas administrativas contempladas van encaminadas a la limitación de las dotaciones de suministro de aguas, puesta en servicio de sondeos, cesiones de derechos de usos de agua y composición de la Comisión Permanente de la Sequía. El ámbito temporal del RDL finalizará el próximo 31 de diciembre.
 - De acuerdo con lo anterior, fueron elegidos los miembros de la Comisión Permanente de la Sequía. Esta Comisión estudia, valora y debate las medidas excepcionales a adoptar en la cuenca del Segura para paliar los efectos de la sequía, para proponerlas a la Presidencia de dicha Comisión.
 - La Comisión Permanente de la Sequía de la CH del Segura celebró su primera reunión el pasado 28 de febrero. Resolvió proponer, en función de los indicadores resultantes a finales de febrero, la declaración del escenario de sequía extraordinaria parcialmente en la UTE Principal, limitando al subsistema cuenca las medidas a adoptar.
 - El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura declaró el 11 de marzo la situación excepcional por sequía extraordinaria en la UTE Principal, a la vista de lo mostrado por los indicadores de sequía y escasez.
 - La Comisión Permanente de la Sequía de la CHS celebró su segunda reunión el 29 de abril de 2024. La Comisión resolvió, en función de los indicadores resultantes a finales de abril, no continuar con la declaración de sequía extraordinaria en la UTE Principal, y propuso declararla parcialmente en las UTE de Ríos Margen Izquierda y Ríos Margen Derecha). Se mantienen las restricciones del 25% al regadío tradicional y no tradicional a la espera de la próxima Comisión de Desembalse. Se constató la no existencia de escenarios de Alerta o Emergencia que precisa la DIA para la explotación de los pozos de sequía.
 - El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura declaró el 5 de junio la situación excepcional por sequía extraordinaria en la Unidades Territoriales de Escasez Ríos margen izquierda y Ríos margen derecha, y simultáneamente se declaró el fin de la sequía extraordinaria en la UTE (Principal) Estas medidas las adoptó la CHS tras constatar el estado en que se encuentra la demarcación a la vista de lo que muestran los índices de sequía y escasez de la cuenca del Segura evaluados a primeros de mes. Para la UTE Ríos Margen Derecha quedó establecida, para el año hidrológico 2023/24, una reducción anual del 12,5% de los derechos inscritos en el catálogo de aguas de todos los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas no destinados a abastecimiento urbano, que tengan su punto de captación en el ámbito territorial correspondiente a esta UTE.
 - La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura, reunida el 21 de junio, propuso establecer un desembalse de 126 hm³ para lo que resta de año hidrológico y mantener en la UTE Principal los porcentajes de reducciones en vigor para los derechos concesionales de los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar, adoptados en la

Comisión de Desembalse del 16 de noviembre de 2023 y publicados en el BOE del 25 de noviembre de 2023, y que son del 25% en valor medio.

- **Demarcación Júcar:**

A principios de febrero se mantuvo una reunión con los usuarios agrícolas del sistema Palancia para advertir de la situación de sequía y escasez y valorar las necesidades de los usuarios en relación con las posibles medidas a aplicar. También se mantuvo contacto posterior con algunos de los usuarios fluyentes de la zona del río Palancia aguas arriba del Regajo.

En el mes de marzo se han celebrado las Comisiones de Desembalse de todos los sistemas.

En abril se ha hecho una segunda reunión de los sistemas Júcar y Palancia, sin cambios en la situación respecto a lo acordado el mes anterior:

En el **sistema Palancia** se ha instado a los usuarios de fluyentes a instalar compuertas regulables en sus tomas y se prohíbe la derivación de caudales hasta que cambie la situación, dado que la aportación natural aguas abajo del embalse del Regajo está por debajo del caudal mínimo ecológico. Los regantes de Segorbe están aplicando sistemas de ahorro tradicionales, basados en turnos de riego y las CR que disponen de pozos de sequía están poniéndolos a punto.

Se recuerda que las restricciones establecidas en el PES deberían ser entre el 40 y el 50% pero dado que no hay aportaciones naturales que permitan cumplir los caudales ecológicos se decide reservar el volumen disponible en el embalse. Como alternativa se activan los pozos concesionales en Sagunto y se estudiará el uso de aguas regeneradas para los regantes del Segorbe.

Finalmente, a petición de los usuarios del embalse y en función del volumen disponible y las necesidades ambientales, se autoriza la suelta de un caudal de 300 L/s entre el 23 de mayo y el 11 de junio (0,45 hm³).

En el **sistema Cenia** se recuerda que el PES establece unas restricciones entre el 15 y el 25% para los usos superficiales. No obstante, dada la situación actual de los recursos y que el volumen almacenado está cerca del volumen mínimo, se acuerda que se restringirán totalmente las sueltas del embalse en cuanto dispongan de autorización para el uso de los pozos de sequía. Se comunicará a los usuarios de caudales fluyentes la prohibición de derivar agua dado que las aportaciones naturales están ya por debajo del caudal ecológico mínimo.

En este sentido, ya se han notificado autorizaciones coyunturales de pozos de sequía a las Comunidades de Regantes de San Rafael del Río y de Uldecona (pozo Montserrat, y pozos Molí Roca II y Abreuradors, respectivamente).

En el **sistema de la Marina Baja** los regantes de Callosa están aplicando restricciones del 50% de carácter voluntario sobre los suministros subterráneos. Además, el resto de regantes está utilizando mayoritariamente aguas regeneradas en lugar de recursos convencionales. No obstante, se recuerdan las restricciones establecidas en el PES entre el 25 y el 50% para los usos superficiales.

En el **sistema Serpis**, ya en el mes de mayo, cuando se celebró la Comisión de Desembalse, en previsión de un empeoramiento de la situación junto con el bajo volumen de agua almacenado en el embalse de Beniarrés, se instó a poner en marcha pozos concesionales y a tramitar las autorizaciones coyunturales para los pozos de sequía, como complemento a los caudales regulados. En el mes de junio entró en Alerta, cumpliéndose las condiciones para autorizar dichos pozos.

En el **sistema Mijares**, que ya había entrado en Alerta, se estableció una restricción superficial del 10%. Se instó a la activación de los pozos concesionales existentes en el ámbito de los regadíos tradicionales y a aumentar el porcentaje de volumen subterráneo en los regadíos mixtos con el fin de preservar, en la medida de lo posible, el volumen superficial.

Adicionalmente, a lo largo del mes de julio se han autorizado coyunturalmente suministros superficiales y subterráneos de escasa cuantía para uso ganadero en el sistema.

El **sistema Turia** ha entrado en Prealerta en el mes de julio. Ya en mayo, en la comisión de desembalse extraordinaria, y en previsión de un empeoramiento de la situación, se solicitó la aplicación de ahorros voluntarios pero debido a las altas temperaturas se decidió mantener las demandas habituales y estudiar la posible ampliación de la reutilización. Está prevista la celebración de una comisión de desembalse extraordinaria en el mes de agosto.

Otra problemática generalizada detectada es el alto consumo invernal, superior a lo habitual, debido a las altas temperaturas. Los regantes manifiestan dificultades para ajustarse a sus concesiones o a los usos consolidados en lo que resta de campaña.

Con carácter general, en las comisiones de desembalse, incluso en los sistemas que aún están en normalidad, se recuerda la importancia de aplicar medidas de ahorro, especialmente en años secos como el actual, para retrasar en lo posible la entrada en situaciones de mayor escasez, sobre todo por si la sequía se alargara a la próxima campaña.

En cualquier caso, se recuerda en todas ellas la obligatoriedad de respetar el volumen máximo concesional e igualmente se solicita especial atención en el cumplimiento de los caudales ecológicos.


- **Demarcación del Ebro:**

Se están sintiendo los impactos de la escasez para el regadío en la margen derecha de la cuenca, principalmente en la UTE Guadalupe alto y medio, y también en la UTE Huerva, aunque en este caso la superficie regable es mucho menor. En ambas UTE se han tomado medidas para restringir el riego. En el caso de la UTE Guadalupe alto y medio se están dando los pasos para la realización de un ensayo de bombeo en el marco de la medida del Plan de Sequía “uso conjunto aguas superficiales-subterráneas en el entorno del manantial de los Fontanales”. Se están registrando problemas para el suministro de las granjas.


HUMEDAD DEL SUELO

A 22 de septiembre los niveles de humedad son muy secos o secos en centro oeste y sur peninsular e Islas Canarias.

Hace 1 semana:



La situación, hace un año, era la siguiente:



4. AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS



Se presentan las estimaciones disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España correspondientes al **30 de junio**, elaboradas con las informaciones remitidas por las Comunidades Autónomas. De los datos publicados, se extrae las siguientes notas relevantes:

• Cereales

La estimación provisional de superficie cosechada de cereales de otoño-invierno para la campaña de comercialización 2024-25, presenta un ascenso del 1 % respecto a la campaña precedente y un descenso de un 4,9 % respecto a la media de las últimas cinco campañas. Por cultivos, se observan ligeros aumentos para la avena (+14,1 %), el centeno (+13,5 %), o el trigo blando (+1,4 %) entre otros, en relación con la campaña 2023.

En cuanto a las estimaciones de las producciones de la cosecha 2024 de todo el grupo en su conjunto, se ha alcanzado la cifra de 16.355 toneladas, lo que supone un aumento del 87,8 % respecto a la campaña 2023 y se encuentran en línea con la media de las últimas cinco campañas. Por cultivos, destacar la producción de la cebada de seis carreras en un 161,8 % o de la avena en un 147,9 % en relación con la campaña precedente. En base a la media de las últimas campañas, la mayor parte de los cereales de invierno se encuentran en línea con las producciones medias o incluso por debajo, como en el caso de la cebada de 6 carreras o el centeno.

Entre los cereales de primavera, las estimaciones de superficie de la cosecha 2024 el maíz, registran un descenso del 3,9 % y de un 4,3 % en su superficie respecto a la cosecha 2023. Por otro lado, se estima un descenso en la superficie de sorgo de un 42 % y de un del 36,9 % en la producción respecto a la campaña anterior, en unos niveles (-13,1 %) inferiores a las producciones de los últimos cinco años. En cuanto al arroz, las estimaciones tanto de superficie (47,9 %) como de producción (73,4 %), son superiores a los datos de la campaña pasada y se encuentran en línea con la media de las últimas campañas.

• Leguminosas de grano

Las estimaciones de superficie de la cosecha 2024-2025 de las leguminosas grano, presentan oscilaciones respecto a los datos de la campaña precedente. Hay ciertos cultivos con aumentos, como son el caso de los garbanzos (+18,3 %) o las judías secas (+15,8 %) y ligeros descensos de la superficie en guisantes secos (-12,7 %), lentejas (- 12,3 %) o veza (-7,6 %). Sin embargo, en general, las leguminosas de grano presentan datos superiores a la media de las últimas campañas. Respecto a las estimaciones de producciones, se muestran importantes aumentos en las cifras de estos cultivos. Los yeros, presentan incrementos del 122,4 %, las lentejas del 118,1 %, la veza (+112,5 %) o los garbanzos (+72,8 %), respecto a las producciones de la campaña 2023.

• Cultivos industriales

Las estimaciones de superficie de la campaña 2024-2025 de la remolacha azucarera de verano, muestran unos datos ligeramente superiores a los de cierre de la campaña precedente. En relación con las primeras estimaciones de producción, se estima un aumento del 39,6 % en relación con los datos de la campaña anterior.

En cuanto a las primeras estimaciones de superficie de la remolacha de invierno, muestran un aumento del 32,4 % respecto a los datos de cierre de la campaña 2023. Las primeras estimaciones de superficie para la campaña 2024-2025 reflejan, para el algodón, un ligero aumento del 0,3 % y para el girasol y la soja, ligeros descensos del 1,2 % y del 2,3 % respectivamente. En cuanto a las producciones, se prevé un incremento para el girasol en un 8,3 % y de un 4,7 % para la soja. Por último, para el cultivo de la colza, se estima una reducción del 13,7 % para la superficie y un aumento del 24,7 % para la producción en relación con los datos de la campaña anterior.

• Tubérculos y Hortalizas

Las primeras estimaciones de superficie de tubérculos de la cosecha 2024-2025 indican, para la patata total, un ligero descenso del 1,9 %. Por clases, las estimaciones de superficies indican, respecto a la campaña anterior, descensos en patata extra temprana (-32,6 %) y patata media estación (-1,8 %) y ligeros aumentos en patata tardía (+1,7 %) y patata temprana (+1,5 %). Respecto a las producciones, la

patata extra temprana muestra un descenso del 33,5 % respecto a los datos de la campaña 2023 y la patata temprana y la patata media estación, un ligero incremento en ambas del 11,2 % y del 3,1 % respectivamente. La superficie del tomate (recolección 1-I/31-V), muestra para la campaña 2024, un ligero aumento del 7,1 % y en la producción, una estimación de crecimiento de un 9 % respecto a los datos de la cosecha anterior. Las primeras estimaciones de superficie del tomate (rec. 1-VI/30-IX), reflejan una disminución del 15,1 % y un ligero aumento del 1,3 % en su producción. En cuanto a las superficies de cebollas, tienen en general, ligeros aumentos respecto a los datos de la campaña precedente, pero son ligeramente inferiores si se comparan con la media de las últimas campañas. Destaca, el aumento de producción de la cebolla babosa, con un incremento del 36,2 % en relación con la campaña 2023.

En otras hortalizas, las estimaciones de las superficies para la campaña 2024, experimentan variaciones respecto a la campaña 2023 que oscilan entre el (+12,1 %) del rábano y el (-22,6 %) de los guisantes verdes. En cuanto a las estimaciones de producción registran aumentos del 26,5 % las zanahorias, los pimientos (+19,4 %), el ajo (+12,2 %) o el espárrago (+4,8 %) y descensos del 14,4 % para los guisantes verdes, las habas verdes (-14,2 %) o el rábano (-9,6 %) respecto a los datos de la campaña anterior.

- **Frutales no cítricos**

En cuanto a las primeras estimaciones de producción de frutales para la cosecha 2024, se estima para la manzana de mesa, una producción similar a la del año precedente. La manzana de sidra refleja un descenso del 11,3 % pero, su producción, es ligeramente superior a la media de las últimas campañas. La pera experimenta un descenso del 15,2 % respecto a los datos de la campaña 2023. En cuanto a los frutales de hueso, se registra un aumento del 26,7 % para el albaricoque, la cereza y la guinda de un 25,6 % y un incremento del 3,3 % para el melocotón en relación con la campaña 2023. Por otro lado, la ciruela, presenta un ligero descenso de la producción del 5,1 % y la nectarina de un 2,3 % respecto a la campaña precedente. Para el higo, los primeros datos estimados suponen un aumento del 24,2 % en comparación con la campaña anterior y se mantienen en línea con la media de las últimas campañas. Respecto a la frambuesa, su producción aumenta ligeramente en un 3,6 % en relación con la campaña 2023 y experimenta una disminución del 28,7 % en relación con la media de las últimas cinco campañas. En frutos secos, las estimaciones de producción de la almendra para la campaña 2024-2025, suponen un aumento del 19,8 % en comparación con la campaña anterior y un ligero aumento en un 6,2 % respecto a la media de las cinco últimas campañas. Para la avellana, los primeros avances de producciones estiman un ligero descenso del 5,8 % respecto a la campaña precedente.

- **Producciones vitivinícolas**

Las estimaciones finales de las producciones vitivinícolas de la cosecha 2023, situaron la producción de vino y mosto en unos 32,4 millones de hl. Los primeros avances de la campaña 2024, estiman una producción de 38,1 millones de hl, lo que supondría un aumento del 17,6 % respecto a la cosecha 2023. En cuanto a las primeras estimaciones de uva de vinificación de la campaña 2024/2025, reflejan una producción de 5,24 millones de toneladas a nivel nacional, un 16,9 % por encima a la campaña precedente.

5. INFORMACION ADICIONAL



5.1. SEGUROS AGRARIOS

La siniestralidad registrada por el seguro agrario en 2023 fue muy elevada, alcanzando la cifra de 1.192,44 millones de euros en concepto de indemnización, lo que unido a los gastos de prestación y gestión de las peritaciones supuso un total de 1.241 millones de euros.

Año 2024

SINIESTRALIDAD 2024: DATOS GENERALES SEGUROS AGRARIOS

Previsión Indemnizaciones (del 1 de enero al 31 de agosto de 2024): 526,21 M€. *Fuente: AGROSEGURO (incluye la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones).*

Superficie afectada (del 1 de enero al 31 de agosto de 2024): 1.379.519 ha. *Fuente: AGROSEGURO*

Cultivos más afectados (del 1 de enero al 31 de agosto de 2024): herbáceos, uva de vino, frutales, hortalizas y cítricos. *Fuente: AGROSEGURO*

5.2 EVENTOS SIGNIFICATIVOS

El mes de agosto ha resultado cálido en conjunto, si bien de manera moderada en algunas zonas del Cantábrico y del norte de Galicia y, por el contrario, de forma extrema en amplias zonas del interior de la península.

Además, ha tenido carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, principalmente a partir de la segunda decena del mes, en gran parte de Aragón, Navarra, La Rioja, este de Castilla y León, Madrid y noroeste de Castilla-La Mancha, donde ha llegado a ser extremadamente húmedo. En efecto, se han producido tormentas a lo largo de todo el mes, en ocasiones de fuerte intensidad, con fuerte aparato eléctrico y puntualmente acompañadas de granizo, que afectaron a las principales producciones próximas a recolección. Se ocasionaron daños de lluvia y pedrisco en los cultivos de frutales de las zonas, especies y variedades tardías, así como en hortalizas (tomate, pimiento, melón, sandía y lechuga), frutos secos y uva de vinificación. Lo mismo ocurrió, asimismo, en cítricos, olivar y uva de mesa de recolección más tardía.

Por el contrario, la falta de precipitación y las altas temperaturas registradas han agravado la falta de producción en cultivos leñosos por la persistente sequía, principalmente en el cultivo de uva de vinificación, en Cataluña y la Región de Murcia. *Fuente: AGROSEGURO*

Boletín JRC MARS

European Commission

**SEGUIMIENTO** | SEQUÍA, CULTIVOS
RENDIMIENTO.ORGANISMO | ESCALA
JRC -EUROPAFECHA DEL DOCUMENTO
Agosto 2024**Informe Seguimiento de cultivos en Europa: Agosto 2024**



El Joint Research Center (JRC) ha publicado su "Informe de seguimiento de cultivos en Europa: JULIO 2024" en el que analiza el panorama agrometeorológico de los países europeos con avances de seguimiento de cultivos y previsión de rendimientos. El periodo que abarca este número es del 1 de julio al 17 de agosto de 2024.

El informe completo se encuentra disponible: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136664>

Previsiones de rendimiento inferiores a la media para la mayoría de los cultivos de la UE debido a las condiciones excepcionalmente calurosas en el sur y al exceso de precipitaciones en el norte.

Graves repercusiones del calor en los cultivos de verano del sur. La revisión a la baja de las previsiones de rendimiento de los cultivos de verano (sobre todo maíz en grano y girasol) se debe principalmente a las temperaturas excepcionalmente altas que se registraron durante el periodo de revisión en la mayor parte del sur, centro-sur y este de Europa. Los cultivos de verano se vieron especialmente afectados en las regiones donde las condiciones de calor coincidieron con una disponibilidad limitada de agua, como ocurrió a menudo en Hungría, Rumanía, Bulgaria y Grecia.

Las elevadas precipitaciones afectaron a los cultivos de invierno en el norte: los malos resultados de los cereales de invierno (en particular el trigo blando y la cebada de invierno) se deben sobre todo a las condiciones excesivamente húmedas que afectaron a amplias zonas del oeste y el norte de Europa. Durante el actual periodo de examen, este fue especialmente el caso de los países bálticos, donde un episodio de lluvias extremadamente intensas provocó encamado y redujo la calidad del grano, disminuyendo sustancialmente las hasta entonces positivas expectativas de rendimiento. Las frecuentes precipitaciones, aunque menos extremas, también dificultaron la cosecha en el norte de Francia, los países del Benelux y el noroeste de Alemania, donde los cultivos de invierno ya se habían visto afectados por unas condiciones excesivamente húmedas durante la mayor parte de la campaña.



5.2. FUENTES:

5.2.1. Situación meteorológica:

- AEMET: <https://www.aemet.es/es/portada>

5.2.2. Hidrología:

- Boletín hidrológico (MITERD): <https://eportal.miteco.gob.es/BoleHWeb/>
- Informe situación de sequía y escasez: (MITERD): <https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento.html>

5.4.3. Avances de superficies y producciones de cultivos:

- SGACE (MAPA): <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/>

5.4.4. Seguro Agrario:

- ENESA (MAPA): <https://www.mapa.gob.es/es/enesa/>
- AGROSEGURO: <https://agroseguro.es/>

5.4.5. Boletín JRC MARS: <https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins>

ANEXO 1. TABLA VALORES SPI.

SPI en agosto de 2024	12 meses (acum. año agric.)	6 meses
A CORUÑA	1.65	1.27
ALBACETE	-1.40	-0.62
ALICANTE	-2.47	-1.03
ALMERIA	-2.23	-0.94
ARABA/ALAVA	0.20	-0.18
ASTURIAS	-0.51	-0.35
AVILA	1.15	0.17
BADAJOS	0.40	0.25
BALEARES	-1.46	0.29
BARCELONA	-1.09	0.55
BIZKAIA	0.01	-0.35
BURGOS	0.37	0.04
CACERES	0.96	0.49
CADIZ	-0.77	0.43
CANTABRIA	-0.81	-0.52
CASTELLON	-1.88	-0.56
CEUTA	-0.23	1.29
CIUDAD REAL	0.33	0.57
CORDOBA	0.11	0.78
CUENCA	0.08	0.42
GIPUZKOA	0.18	-0.35
GIRONA	-1.42	0.52
GRANADA	-0.69	0.32
GUADALAJARA	1.23	0.92
HUELVA	-0.01	0.36
HUESCA	0.49	0.40
JAEN	-0.12	0.59
LA RIOJA	1.02	0.25
LAS PALMAS	-1.45	0.31
LEON	0.60	0.50
LLEIDA	-0.54	0.27
LUGO	1.33	1.00
MADRID	1.38	0.07
MALAGA	-1.43	0.14
MELILLA	-1.62	-0.66
MURCIA	-2.03	-0.77
NAVARRA	0.65	0.11
OURENSE	1.31	0.95
PALENCIA	0.58	0.39
PONTEVEDRA	1.78	1.46
SALAMANCA	0.63	0.56
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-1.54	-0.10
SEGOVIA	2.06	0.50
SEVILLA	0.05	0.70
SORIA	1.50	0.55
TARRAGONA	-1.38	-0.40
TERUEL	-1.12	-0.42
TOLEDO	1.49	0.55
VALENCIA	-1.72	-0.65
VALLADOLID	0.92	0.53
ZAMORA	0.51	0.50
ZARAGOZA	0.33	0.29