



# MEDREGAL LIMÓN

## YTL

*Seriola rivoliana* (Valenciennes, 1833)



Nombres **FAO**: **es** medregal limón  
**fr** sériole limon  
**en** longfin yellowtail



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

**LONGITUD MÁXIMA: 160 cm**

### Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y algo comprimido lateralmente. El perfil anterior de la cabeza es redondeado. El medregal limón no llega nunca a alcanzar el tamaño del pez de limón cuya talla media suele ser menor a 40 cm. Cabeza y boca grande. Las mandíbulas, que están dotadas de pequeños dientes, se extienden hasta la vertical del centro del ojo. Presenta el supramaxilar casi tan ancho como el diámetro del ojo.

Presenta una característica banda negruzca oblicua sobre los ojos que se dirige hacia el origen de la primera dorsal.

Posee dos aletas dorsales. La primera, más corta y formada por 8 espinas. La segunda contiene una sola espina y 27-33 radios blandos, presenta los primeros radios un poco más altos formando un lóbulo alto con aspecto falciforme y 1,5 veces más largo que

la aleta pectoral. También posee dos aletas anales. La primera se compone de 2 radios espinosos poco desarrollados, y la segunda tiene 1 solo radio duro y 18-22 radios blandos. La segunda anal es más corta que la segunda dorsal y, al igual que ésta, los primeros radios están más desarrollados y forman un lóbulo de longitud característicamente menor a la de la aleta pectoral. El pedúnculo caudal es estrecho y en los adultos presenta una quilla ósea a cada lado y dos surcos transversales, uno dorsal y otro ventral. La aleta caudal es potente y marcadamente ahorquillada

#### Especies con caracteres semejantes

*Seriola fasciata* (medregal listado)


*Seriola durmerili* (pez de limón)

### Nombres Comerciales y Locales

Canarias	medregal, medregal negro
----------	--------------------------

## Descripción General

El color del cuerpo es grisáceo. El dorso es más oscuro y a veces puede presentar reflejos dorados, y los flancos y el vientre son plateados. Presenta una conspicua banda oblicua de color negruzco sobre los ojos. Las aletas son de color oscuro excepto las ventrales que son blancas.



Cuerpo cubierto de pequeñas escamas cicloideas. Línea lateral ligeramente arqueada en su parte anterior; carece de escamas modificadas.

## Hábitat y comportamiento



Especie nectónica que habita en la plataforma entre 50 y 150 m de profundidad. En primavera migra hacia aguas costeras para reproducirse y pasar el verano.


Los juveniles se encuentran agrupados bajo objetos flotantes durante algunos meses hasta que abandonan estos refugios y se vuelven decididamente epibentónicos de hábitos costeros. Se mantienen agrupados formando bancos

ocasionalmente densos.

El medregal listado es un buen nadador y alcanza grandes velocidades.

Especie básicamente ictiófaga que se alimenta de peces que nadan entre aguas, como la boga (*Boops boops*), la sardina (*Sardina pilchardus*) o la alacha (*Sardinella aurita*), entre otras muchas especies. Complementa la dieta con moluscos cefalópodos.

## Distribución




Se trata de una especie cosmopolita de aguas templadas y tropicales que se encuentra en el Índico, el Pacífico y el Atlántico occidental. En el Atlántico oriental, se ha constatado su presencia real en Portugal y las islas Azores y Madeira, pero son dudosas las citas de otras zonas. Recientemente se ha podido comprobar su presencia en el Mediterráneo central.

## Reproducción

El medregal limón tiene los sexos separados y se reproduce a finales de primavera y comienzo del verano, cerca de la costa. Huevos y larvas quedan a merced de las corrientes hasta que los jóvenes se asientan en diversos objetos flotantes.

El crecimiento es muy rápido. Los ejemplares de mayor tamaño pueden llegar a medir casi 1,6 m de longitud y los casi 60 kg de peso.

## Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

## Artes de Pesca

Se captura mediante palangres flotantes o al curricán de fondo con cebo vivo (normalmente un calamar). En el Mediterráneo la moruna es una práctica habitual, un arte tradicional estático de barrera parecido a una almadraba de pequeño tamaño.

El medregal limón es una especie trofeo para los pescadores deportivos que la capturan al curricán, al curricán de fondo o mediante la práctica del jigging. También es una captura muy estimada por los pescadores submarinos, que la capturan a la espera.

## Comercialización

Especie de carne bastante apreciada, si bien su aceptación es desigual a lo largo de la geografía española. Se vende fresco y salado o seco.

Se desembarca fresco y entero.

