


MEDREGAL LISTADO

RLF

Seriola fasciata (Bloch, 1793)



Nombres **FAO**: **es** medregal listado
fr sériole babiane
en lesser amberjack



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 67,5 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y algo comprimido lateralmente. Tiene mayor simetría dorsoventral que otras seriolas; el vientre es tan abombado como el dorso. El perfil anterior de la cabeza es redondeado. El medregal listado no llega nunca a alcanzar el tamaño del pez de limón cuya talla habitual no supera los 40 cm.

Cabeza y boca grandes. Posee un supramaxilar con un ancho menor al diámetro del ojo. Ambas mandíbulas están dotadas de pequeños dientes y se extienden hasta la vertical del centro del ojo.

No presenta ninguna banda de color sobre los ojos.

Posee dos aletas dorsales. La primera, más corta y formada por 8 espinas. La segunda contiene una sola espina y 28-33 radios

blandos y presenta los primeros radios un poco más altos formando un lóbulo. También posee dos aletas anales. La primera se compone de 2 radios espinosos poco desarrollados, y la segunda tiene 1 solo radio duro y 17-20 radios blandos. La segunda anal es más corta que la segunda dorsal y, al igual que ésta, los primeros radios están más desarrollados y forman un lóbulo de longitud característicamente menor a la de la aleta pectoral. El pedúnculo caudal es estrecho y en los adultos presenta una quilla ósea a cada lado y dos surcos transversales, uno dorsal y otro ventral. La aleta caudal es potente y marcadamente ahorquillada.

Especies con caracteres semejantes

Seriola rivoliana (medregal limón)


Seriola durmerili (pez de limón)

Nombres Comerciales y Locales

Canarias	blanquilla, loquillo, medregal
Galicia	peixe limón listado

Descripción General

El color del cuerpo es violáceo, algo más oscuro en el dorso y plateado en el vientre. En los ejemplares jóvenes existen 7 u 8 bandas verticales muy visibles más oscuras. Esta coloración se mantiene hasta que los ejemplares miden unos 30 cm de longitud. Cuerpo cubierto de pequeñas escamas cicloideas. Línea lateral casi recta, ligeramente arqueada en su parte anterior; que carece de escamas modificadas.



Hábitat y comportamiento



Especie nectónica que habita en la plataforma entre 50 y 150 m de profundidad. En primavera migra hacia aguas costeras para reproducirse y pasar el verano.

Los juveniles se encuentran agrupados bajo objetos flotantes durante algunos meses hasta que abandonan estos refugios y se vuelven decididamente epibentónicos de hábitos costeros. Se mantienen agrupados formando

bancos ocasionalmente densos.

El medregal listado es un buen nadador y alcanza grandes velocidades.

Especie básicamente ictiófaga que se alimenta de peces que nadan entre aguas, como la boga (*Boops boops*), la sardina (*Sardina pilchardus*) o la alacha (*Sardinella aurita*), entre otras muchas especies. Complementa la dieta con moluscos cefalópodos.

Distribución



Se encuentra a ambos lados del Atlántico. En el Atlántico occidental se encuentra de Massachusetts a Brasil, y en el Atlántico oriental sólo se ha constatado fehacientemente su existencia en la isla de Madeira, donde es abundante, y en las islas Canarias. Desde


1993 se ha constatado su presencia en el Mediterráneo.

Reproducción

El medregal listado tiene los sexos separados y se reproduce a finales de primavera y comienzo del verano, cerca de la costa. Huevos y larvas quedan a merced de las corrientes hasta que los jóvenes se asientan en diversos objetos flotantes.

El crecimiento es muy rápido. Los ejemplares de mayor tamaño pueden llegar a medir 67,5 cm de longitud y los 4,6 kg de peso.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura mediante palangres flotantes o al curricán de fondo con cebo vivo (normalmente un calamar). En el Mediterráneo la moruna es una práctica habitual, un arte tradicional estático de barrera parecido a una almadraba de pequeño tamaño.

El medregal listado es una especie trofeo para los pescadores deportivos que la capturan al curricán, al curricán de fondo o mediante la práctica del jigging. También es una captura muy estimada por los pescadores submarinos, que la capturan a la espera.

Comercialización

Especie de carne bastante apreciada, si bien su aceptación es desigual a lo largo de la geografía española.

Se desembarca fresco y entero.

