



# SEÑORITA

## WRA

*Symphodus tinca* (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** señorita  
**fr** crénilabre paon  
**en** peacock wrasse



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-		
comercial	-	-	-	10,8-15,3	11,5-15,2

LONGITUD MÁXIMA: 44 cm

### Caracteres más significativos

El cuerpo está comprimido lateralmente. Su tamaño habitual es de 20 cm.

La cabeza es muy larga, más que la altura del cuerpo. El morro es puntiagudo, y los labios de la boca tienen entre 6 y 9 pliegues.

Posee una única aleta dorsal, compuesta por 14-17 radios espinosos y 9-12 radios blandos. La aleta anal está formada por 3 espinas y 8-12 radios blandos, y tanto esta como la dorsal se caracterizan por tener los radios blandos más largos que los espinosos.

### Especies con caracteres semejantes

*Symphodus bailloni* (porredano)


*Symphodus melops* (porredana)

### Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	tordo
Asturias	charrón, pantón, serrano
Baleares	llevió, roquer, ruqué, satch, satx, tord flasader, tord flassadé
Cantabria	charrón, pantón, serrano
Cataluña	griva, llavió, petare, rosinyol, tabans, tord, tord gros, tort
Com. Valenciana	cochero, rosignol
Galicia	budión, charrón, merlón, pantón, pinto, serrano, vello, zorzal
Murcia	satx
País Vasco	budión, chilibitu, karraspio, koloreanitz, txilibitu

## Descripción General

La coloración de esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual; las hembras y los juveniles son de un color gris verdoso, o ligeramente pardo, con dos bandas longitudinales más oscuras: la inferior va desde el ojo hasta el pedúnculo caudal y la superior, no siempre bien visible, se encuentra hacia el centro de la mitad superior del cuerpo. El pedúnculo caudal presenta una mancha negra y una banda oscura entre los ojos y encima de la boca. Los machos tienen una coloración amarillo verdosa, con tres bandas longitudinales oscuras punteadas de rojo y azul. La mancha facial es más marcada que en las hembras y los juveniles y es característico un punteado azul en las aletas.



## Hábitat y comportamiento



La señorita es una especie litoral, propia de fondos rocosos y praderas de fanerógamas, que acostumbra a moverse a poca profundidad, entre 1 y 20 m, si bien puede llegar a los 50 m.

Los juveniles son gregarios, pero se van volviendo solitarios a medida que crecen y se hacen adultos.

Se alimentan de poliquetos, erizos pequeños, ofiuras, bivalvos, isópodos y cangrejos. Para alimentarse, tienen la costumbre de succionar y expulsar la arena del fondo hábito con el que atraen a otros peces, incluidas sus presas.

## Distribución



Se encuentra en el Atlántico este, desde el Cantábrico hasta Marruecos, y en todo el mar Mediterráneo, incluido el mar Negro.

## Reproducción

El periodo reproductor tiene lugar entre los meses de abril y junio.

El macho construye un nido de algas, y cuando lo finaliza, lo abandona para buscar una hembra. Cuando la encuentra, ambos se acercan al nido y dan varias vueltas a su alrededor. Posteriormente la hembra pasa frotando su vientre sobre el nido, liberando en él los huevos, y poco después el macho hace lo mismo, fecundándolos. Hay ocasiones en que machos de tamaño mediano realizan una fecundación parásita, adelantándose en la fecundación al macho constructor del nido.

## Artes de Pesca

Especie de escaso interés pesquero, que no es objeto de una pesquería específica, pero que se captura frecuentemente con trasmallo. Los grandes machos pueden ser víctimas propiciatorias de los pescadores submarinos novatos.

## Comercialización

Poco interesante desde el punto de vista gastronómico, entra a formar parte de las sopas de pescado. Se desembarca fresco y entero.

