

# Black Rose



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación muy débil  
Densidad débil

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Color nudo* Verde en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Nula o muy baja en el nudo  
Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales* Débil

*Densidad pelos tumbados* Muy débil entre nervios  
Muy débil sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Muy grande

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Poco abierto-cerrado

*Hinchazón del haz* Débil

*Perfil en sección transversal* Bordes hacia el envés

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad media con lóbulos cerrados

*Pigmentación del haz* Débil

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Nula o muy baja


*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Nula o muy baja-baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura media



# Black Rose



## Fenología:

Época de desborre: temprana-media

Época de maduración: media

## Racimo:

Tamaño Muy grande

Compacidad Muy suelto

Longitud pedúnculo Muy corto

## Baya:

Tamaño Muy grande

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Negra-azul

Forma de perfil En forma de cuerno

Separación pedicelo Difícil-relativamente fácil

Grosor piel Media

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente dura-muy dura

Suculencia pulpa Jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formadas

## Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Estriada