

# Cardinal



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Muy abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad nula o muy baja

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:


<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-media
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil entre nervios Nula o muy débil sobre nervios

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy débil de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes a ambos lados convexos de longitud media con relación longitud-anchura mediana



# Cardinal



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Suelto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Muy grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Roja-violeta oscura
<i>Forma del perfil</i>	Esférica
<i>Separación pedicelo</i>	Relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Gusto especial
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

## **Fenología:**

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

## **Aptitudes agronómicas:**

- Vigor medio, muy fértil, de ciclo corto.
- Se aconseja una poda corta, portainjerto poco vigoroso, y abonado escaso.
- El hollejo puede rajarse si llueve durante la vendimia.
- Resiste a la sequía, bien adaptado a los terrenos poco fértiles. Admite podas cortas. Exigente en potasio. En zonas frescas no madura correctamente. Muy buena uva de mesa.
- Sabor agradable.
- Aguanta bien el transporte.
- Muy sensible al oídio.