

# Corredera



## Ampelografía

### Sumidad:

|   |  |
|---|--|
| <i>Apertura extremidad</i>              | Completamente abierta                              |
| <i>Pelos postrados de la extremidad</i> | Pigmentación nula o muy débil<br>densidad muy alta |

### Pámpano:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>Color entrenudo</i>         | Verde en la cara dorsal<br>Verde en la cara ventral |
| <i>Color nudo</i>              | Verde en la cara dorsal<br>Verde en la cara ventral |
| <i>Densidad pelos tumbados</i> | Nula o muy baja-baja en nudos<br>baja en entrenudos |

### Hoja joven:

|   |  |
|---|--|
| <i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i> | Nula o muy débil                               |
| <i>Densidad pelos tumbados</i>                          | Media-alta entre nervios<br>Baja sobre nervios |

### Hoja adulta:

|   |   |
|---|---|
| <i>Tamaño del limbo</i>   | Grande  |
| <i>Forma del limbo</i>  | Pentagonal  |
| <i>Número de lóbulos</i>  | Cinco   |
| <i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>                                      | Ligeramente superpuestos-<br>medio superpuestos   |
| <i>Hinchazón del haz</i>  | Débil   |
| <i>Perfil en sección transversal</i>  | En forma de V   |
| <i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i> | Profundidad media con lóbulos<br>muy superpuestos   |
| <i>Pigmentación del haz</i>   | Entre nula o muy débil y débil  |
| <i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>                          | Media   |
| <i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>                       | Media-densa   |
| <i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>                              | Peciolo más corto que el nervio<br>central con densidad nula o muy<br>baja-baja de pelos tumbados |
| <i>Forma y longitud de dientes</i>  | Dientes con ambos lados convexos<br>de longitud medios con relación<br>longitud-anchura media     |



# Corredera



## **Racimo:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <i>Tamaño</i>             | Medio-grande |
| <i>Compacidad</i>         | Suelto-medio |
| <i>Longitud pedúnculo</i> | Medio        |

## **Baya:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Tamaño</i>               |                     |
| <i>Uniformidad tamaño</i>   | Uniforme            |
| <i>Color Epidermis</i>      | Verde amarilla      |
| <i>Forma de perfil</i>      | Circular            |
| <i>Separación pedicelo</i>  | Difícil             |
| <i>Grosor piel</i>          |                     |
| <i>Pigmentación pulpa</i>   | Ausente o muy débil |
| <i>Consistencia pulpa</i>   | Ligeramente dura    |
| <i>Suculencia pulpa</i>     | Ligeramente jugosa  |
| <i>Sabores particulares</i> | Ninguno             |
| <i>Formación pepitas</i>    | Bien formada        |

## **Sarmiento:**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Color</i>              | Marrón amarillento |
| <i>Relieve superficie</i> | Estriado           |

## **Fenología:**

Época de desborre: temprana

Época de maduración: media

## **Aptitudes agronómicas:**

- Vigor medio-alto.
- Fertilidad alta, rendimiento alto, supera los 4 kg/cepa.
- Algo sensible al oídio.

## **Potencial enológico:**

- Mosto con grado Baumé alto, 12,2 y acidez media, 7,78 g/l en tartárico.
- Con esta variedad se elaboran vinos equilibrados, de cuerpo medio, con ligero aroma afrutado.