

Espadeiro

Sinonimias: Torneiro.



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula-débil Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Media
---	-------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte
--------------------------------	--------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
-------------------------	-------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Siete
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en lira
--	----------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media-fuerte
--------------------------	--------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Abiertos
---	----------


<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Baja-media
--	------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Baja
--	------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medianos con relación longitud-anchura media
------------------------------------	---



Espadeiro



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-mediano
<i>Compacidad</i>	medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Esférica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Fina
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Suculencia pulpa</i>	
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: entre media y tardía

Aptitudes agronómicas:

- Planta medianamente vigorosa, porte erguida.
- Fertilidad media. Medianamente productiva, racimo de tamaño mediano.
- Medianamente resistente a sequía, se adapta mejor a terrenos sueltos. Admite poda corta, aunque se comporta mejor con poda larga.
- Resistente a plagas y enfermedades.

Potencial enológico:

- Grado alcohólico medio, color cereza oscuro, posee aromas frutales intensos y un cierto tono a especias que recuerda a Cabernet Sauvignon, acidez alta, vino con mucha personalidad, cuerpo y calidad.
- Se elabora como vino joven mezclado con otras variedades tintas y blancas, es una variedad excelente para elaborarla como monovarietal con un ligero paso por bodega de roble.

