

# Garnacha Tinta

Sinonimias: Gironet. Lladoner.



## Ampelografía

### Sumidad:

|   |   |
|---|---|
| <i>Apertura extremidad</i>              | Abierta                                       |
| <i>Pelos postrados de la extremidad</i> | Pigmentación media-muy alta<br>Densidad débil |

### Pámpano:


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>Color entrenudo</i>         | Verde en la cara dorsal<br>Verde en la cara ventral           |
| <i>Color nudo</i>              | Verde en la cara dorsal<br>Verde en la cara ventral           |
| <i>Densidad pelos tumbados</i> | Nula o muy baja en el nudo<br>Nula o muy baja en el entrenudo |

### Hoja joven:

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i> | Débil          |
| <i>Densidad pelos tumbados</i>                          | Nula-muy débil |

### Hoja adulta:

|   |   |
|---|---|
| <i>Tamaño del limbo</i>   | Medio   |
| <i>Forma del limbo</i>  | Pentagonal  |
| <i>Número de lóbulos</i>  | Cinco   |
| <i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>                                      | Abierto en lira   |
| <i>Hinchazón del haz</i>  | Débil   |
| <i>Perfil en sección transversal</i>  | Alabeado  |
| <i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i> | Profundidad superficial con lóbulos cerrados-superpuestos                     |
| <i>Pigmentación del haz</i>   | Nula  |
| <i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>                          | Nula o muy baja   |
| <i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>                       | Nula o muy baja   |
| <i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>                              | Nula o muy baja   |
| <i>Forma y longitud de dientes</i>  | Dientes rectilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana |



# Garnacha Tinta



## **Racimo:**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <i>Tamaño</i>             | Pequeño-mediano       |
| <i>Compacidad</i>         | Compacto-muy compacto |
| <i>Longitud pedúnculo</i> | Corto                 |

## **Baya:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Tamaño</i>               | Mediana             |
| <i>Uniformidad tamaño</i>   | Uniforme            |
| <i>Color Epidermis</i>      | Rojo-violeta oscuro |
| <i>Forma de perfil</i>      | Esférica            |
| <i>Separación pedicelo</i>  | Difícil             |
| <i>Grosor piel</i>          | Fina                |
| <i>Pigmentación pulpa</i>   | No coloreada        |
| <i>Consistencia pulpa</i>   | Blanda              |
| <i>Suculencia pulpa</i>     | Jugosa              |
| <i>Sabores particulares</i> | Ninguno             |
| <i>Formación pepitas</i>    | Presentes           |

## **Sarmiento:**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Color</i>              | Marrón   |
| <i>Relieve superficie</i> | Estriado |

## **Fenología:**

Época de desborre: media

Época de maduración: media

## **Aptitudes agronómicas:**

- Planta muy vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad elevada. Producción entre media y alta, racimos entre medianos y grandes.
- Muy resistente a sequía, muy versátil, se adapta a todo tipo de suelos. Se puede podar en poda corta aunque tampoco va mal con poda larga.
- Sensible a mildiu y a botrytis, es sensible el corrimiento de racimo.

## **Potencial enológico:**

- Vinos alcohólicos, color granate, aromas ligeros con tonos de fruta roja madura, acidez entre media y alta, vino poco estructurado.
- Se emplea para crianzas mezclándolo con Tempranillo, Cabernet, Macabeo, Syrah, Graciano. Como vino joven no es interesante por su rápida oxidación. Su mayor vocación es la elaboración de rosados a partir de monovarietales de Garnacha.

