

Garrido Fino



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Muy abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil-media Densidad media-alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	-----------------------------------------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos
--------------------------------	-----------------------------------------------------------

Hoja joven:


<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Media
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Medio
<i>Perfil en sección transversal</i>	Forma de V
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos cerrados
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja-baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados.
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana.



Garrido Fino



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Media
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Mediana-grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Aplastada
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillo-marrón Amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media tardía

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio alto.
- Fertilidad alta. Peso del racimo y compacidad alta.
- Rendimiento medio alto.
- Sensible a la podredumbre del racimo.

Potencial enológico:

- Mostos con un grado Baumé medio.
- Acidez media.
- Vinos ligeramente aromáticos.
- En boca suave, ligero y agradable.

