

Listán de Huelva



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación fuerte Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Media
---	-------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte
--------------------------------	--------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
-------------------------	--------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Ligeramente superpuestos en V
--	-------------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	En canal
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos superpuestos
---	--


<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media-alta
--	------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-baja
---	-----------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Corto-baja
--	------------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Mezcla rectilíneos-convexos de longitud medianos con relación longitud-anchura pequeña
------------------------------------	--



Listán de Huelva



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Mediano-grande
<i>Compacidad</i>	Mediano
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Esférica
<i>Separación pedicelo</i>	Fácil
<i>Grosor piel</i>	Fina
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de comienzo de envero: media

Aptitudes agronómicas:

- Planta vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad alta, producción media, racimos medianos.
- Resistencia a la sequía, se adapta mejor a suelos sueltos con bajo contenido de caliza. Se puede podar con podas cortas y largas.
- Sensible a oídio y algo sensible a botrytis.

