

# Mazuela

Sinonimias: Cariñena. Mazuelo. Samsó.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Sin pigmentación Densidad media-alta

### Pámpano:


<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula-baja en el nudo Nula-baja en el entrenudo

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Sin pigmentación
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media-alta entre nervios Baja sobre nervios

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Penta lobulada
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en U
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Limbo entre plano y alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Haz glabro Baja entre nervios del envés
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Media sobre nervios del envés
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo muy corto con densidad baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes entre rectilíneos y convexos de longitud medio-larga y con relación longitud-anchura media



# Mazuela



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	Regular
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media-gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Entre blanda y ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Liso

## **Fenología:**

**Época de desborre:** tardía

**Época de maduración:** media-tardía

## **Aptitudes agronómicas:**

- Variedad muy productiva, de porte erguido. No cultivar en zonas tardías.
- Resistente a la sequía, bien adaptada a terrenos poco fértiles. Admite podas cortas. Exigente en potasio. En zonas frescas no madura correctamente.
- Muy sensible al oídio. Poco sensible a botrytis y excoriosis.

## **Potencial enológico:**

- Vinos alcohólicos con bastante color, carentes de fruta y suavidad. Taninos astringentes, herbáceos y amargos.
- Mejores resultados con la técnica de maceración carbónica gracias a su alta acidez y al desarrollo de aromas jóvenes típicos. En zonas poco fértiles, con buenos suelos, viñas adultas y producción limitada, se obtienen vinos de calidad.
- Se utiliza sobre todo para mezclas aportando acidez.

