

Monastrell

Sinonimias: Mourvedre.



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad alta-muy alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-media
---	-------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Alta-muy alta
--------------------------------	---------------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
-------------------------	-------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Tres
--------------------------	------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en lira
--	-----------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos abiertos
---	--


<i>Pigmentación del haz</i>	Punto peciolar rojo
-----------------------------	---------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Alta
--	------


<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
---	-----------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Nula o muy baja
--	-----------------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana
------------------------------------	---



Monastrell



Racimo:

Tamaño	Pequeño-mediano
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Pequeña-mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul negra
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Media
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda-ligeramente dura
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriada

Fenología:

Época de desborre: tardía

Época de maduración: muy tardía

Aptitudes agronómicas:

- Cepa exigente de cultivo delicado. Requiere temperaturas elevadas.
- Porte erecto aunque no es sensible al viento, fertilidad media con tendencia a la vecería, exige poda corta en espaldera o vaso. Rendimiento bajo.
- Muy exigente en Mg y K. Exterioriza fácilmente la toxicidad provocada por la simazina. Muy sensible a sequía.
- Poco sensible a la excoriosis y botrytis, medianamente sensible al oídio y ácaros. Sensible al mildiu y podredumbre ácida.

Potencial enológico:

- Máximo potencial en caso de vendimias bien maduras, dando vinos ricos en alcohol, muy pigmentados, tánicos y estructurados, ásperos en juventud, por lo que necesitan crianza de acidez débil.
- Apto para técnicas de maceración carbónica. Muy resistente a la oxidación.

