

Pinot Noir



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad media

Pámpano:



<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Pequeño
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Tres-cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	En forma de V
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos abiertos-cerrados
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja-baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña



Pinot Noir



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Muy pequeña-pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Negra-azul
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Asurcada

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: temprana

Aptitudes agronómicas:

- Bien adaptada a zonas templadas, mejores resultados en terrenos argílico calcáreos y cuando se controlan vigor y rendimiento.
- Muy sensible a las quemaduras de las bayas por el sol, y a la rotura en sobre maduración.
- Sensible al mildiu, cicadela, botrytis.
- Hipersensibilidad al entrenudo corto.

Potencial enológico:

- Vinos tintos para crianza con buen cuerpo, finura, intensidad y complejidad aromática."
- Color rojo rubí, a veces con reflejos marrones, a menudo poco intenso aunque estable.
- Elevado potencial de acumulación de azúcar, con acidez media que a veces es insuficiente.

