

Prieto Picudo



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Media-fuerte
---	--------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte
--------------------------------	--------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Pequeño-medio
-------------------------	---------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Siete
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en lira
--	--------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
--------------------------	-------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Plano
--------------------------------------	-------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos superpuestos
---	--



<i>Pigmentación del haz</i>	Rojo hasta la primera bifurcación
-----------------------------	-----------------------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
--	-------


<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-baja
---	-----------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Baja
--	------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud mediana y con relación longitud-anchura media
------------------------------------	--



Prieto Picudo



Racimo:

Tamaño	Pequeño
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Corto-muy corto

Baya:

Tamaño	Pequeña
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul-negra
Forma de perfil	Acuminada
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón amarillento
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: medio-temprano

Época de comienzo de envero: temprano

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte semirrastrero.
- Fertilidad media, producción baja, racimos medianos.
- Poco resistente a sequía, se adapta mejor a suelos frescos y clima suave. Precisa podas largas.
- Es sensible a los golpes de sol y algo sensible a oídio.

Potencial enológico:

- Vino alcohólico, con color cereza con tonalidades violáceas, variedad muy aromática con tonos frutas del bosque y aromas especiados de pimienta negra, acidez alta. Interesante persistencia en boca y aromas retronasales.
- Su empleo ha sido la elaboración de vinos rosados y claretes con una punta de aguja. Actualmente en muchas zonas se empiezan a elaborar tintos monovarietales o mezclados con Mencía que dan vinos de mucho interés.

