

# Queen



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Muy abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad nula o muy baja

### Pámpano:


<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil entre nervios Nula o muy débil sobre nervios

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Muy grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-abiertos
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Forma de V-plano
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad muy superficial con lóbulos cerrados
<i>Pigmentación del haz</i>	Media
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central, con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes a ambos lados convexos de longitud largos y con relación longitud-anchura media-grande



# Queen



## Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: media

## Aptitudes agronómicas:

- Productividad alta y vigor medio.
- Bien adaptada a podas mixtas y conducción en parral.
- Considerada como una excelente uva de mesa.
- Buena conservación en frigorífico y resistencia al transporte.
- Alto contenido de azúcar en el mosto y baja acidez total.

## Racimo:

Tamaño Muy grande

Compacidad Suelto-medio

Longitud pedúnculo Corto

## Baya:

Tamaño Muy grande

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Rojo violeta oscura

Forma de perfil Ovoide-Tronco-ovoide

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Gruesa

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente dura

Suculencia pulpa Ligeramente jugosa-Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formada

## Sarmiento:

Color Amarillento-marrón  
Amarillento

Relieve superficie Estriada