

# Rufete



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación media  
Densidad alta

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde con rayas rojas en la cara ventral

*Color nudo* Verde en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Bajo en el nudo  
Media en el entrenudo

### Hoja joven:

*Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales* Media

*Densidad pelos tumbados* Densa-muy densa

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Medio

*Forma del limbo* Orbicular

*Número de lóbulos* Siete

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Superpuestos en V

*Hinchazón del haz* Media

*Perfil en sección transversal* En canal

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad media con lóbulos superpuestos


*Pigmentación del haz* Nula

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Media

*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Nula-baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo* Baja

*Forma y longitud de dientes* Dientes con ambos lados convexos de longitud largos y con relación longitud-anchura grande



# Rufete



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Pequeño
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul negra
<i>Forma de perfil</i>	Esférica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Fina-media
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

## **Fenología:**

Época de desborre: temprana

Época de maduración: temprana

## **Aptitudes agronómicas:**

- Planta poco vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad muy baja. Producción baja, racimos pequeños.
- Poco resistente a sequía, se adapta a suelos frescos con altos contenidos de arcilla. Prefiere podas largas para obtener producciones aceptables.
- Algo sensible a oídio y a los golpes de calor.

## **Potencial enológico:**

- Vinos de grado alcohólico medio, color picota, ligeramente aromático con olores herbáceos y a especias, acidez entre media y alta, el paso de boca es agradable y muy personal.
- Se emplea para la elaboración de vinos jóvenes mezclados con Tempranillo y Mouratón, actualmente se está empezando a mezclar con variedades locales como la Bruñal y Bastardillo para la elaboración de vinos de crianza.

