

Sousón



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil en el nudo Baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Media
---	-------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Densa
--------------------------------	-------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en lira
--	-------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Fuerte
--------------------------	--------

<i>Perfil en sección transversal</i>	En canal
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos abiertos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
--	-------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula
---	------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Baja
--	------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud largos y con relación longitud-anchura grande
------------------------------------	---



Sousón



Racimo:

Tamaño	Muy pequeño-pequeño
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Pequeña-mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul-negra
Forma de perfil	Acuminada
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina-media
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Muy jugosa
Sabores particulares	Gusto herbáceo
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón rojizo
Relieve superficie	Liso-estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de comienzo de envero: media-tardía

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte semirrastrero.
- Fertilidad media. Poco productiva, tamaño entre pequeño y mediano.
- Medianamente resistente a sequía, se adapta mejor a terrenos sueltos. Se adapta mejor a la poda larga.
- Resistente a plagas y enfermedades.

Potencial enológico:

- Grado alcohólico medio, color picota, posee aromas frutales intensos a frutas del bosque y mora, acidez alta, vino con mucha personalidad.
- Se elabora como vino joven mezclado con otras variedades tintas y blancas, es una variedad excelente para elaborarla como monovarietal con un ligero paso por barrica de roble.

