

Sultanina

Sinonimias: Thompson Seedless



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad

Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad

Pigmentación muy débil
Densidad nula o muy débil-débil

Pámpano:

Color entrenudo

Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color entrenudo

Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados

Nula o muy débil entre nervios
Débil sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Grande

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar

Poco abierto-ligeramente superpuestos

Hinchazón del haz

Débil

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores

Profundidad muy superficial-superficial con lóbulos abiertos

Pigmentación del haz

Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales



Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo


Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura media-grande



Sultanina



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Suelto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña o grande (en función de tratamientos)
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Fina-media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa-Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Rudimentarias

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillo
<i>Relieve superficie</i>	Lisa-estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

Aptitudes agronómicas:

- Muy vigorosa y medianamente productiva. Se adapta bien a la conducción en parral. Fertilidad débil, exige poda larga. Sensible al corrimiento y al millerandage.
- Cuando no se cultiva adecuadamente los racimos se desgranar fácilmente.
- Al ser apirena se aconsejan diversos tratamientos, como giberélico, aclareo de racimos, anillado y aclareo de bayas.
- Cierta sensibilidad al oídio. Sensible a la antracnosis y al mildiu.

Potencial enológico:

- Vino neutro de acidez pronunciada, fresco. A veces como vino base para vinos espumosos.
- Uva óptima para el consumo en fresco (muy azucarada, acidez delicada, piel delgada, sabor neutro) y excepcional para el consumo como uva pasificada, puesto que las bayas se secan fácilmente dando pasas de gran calidad.