

Sylvaner



Ampelografía

Sumidad:

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Apertura extremidad</i> | Abierta |
| <i>Pelos postrados de la extremidad</i> | Pigmentación nula o muy débil Densidad nula-baja |

Pámpano:


| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <i>Color entrenudo</i> | Verde en la cara dorsal Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral |
| <i>Color nudo</i> | Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral |
| <i>Densidad pelos tumbados</i> | Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos |

Hoja joven:

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i> | Nula o muy débil |
| <i>Densidad pelos tumbados</i> | Nula o muy baja entre nervios Baja sobre nervios |

Hoja adulta:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tamaño del limbo</i> | Media |
| <i>Forma del limbo</i> | Orbicular |
| <i>Número de lóbulos</i> | Tres-cinco |
| <i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i> | Poco abierto |
| <i>Hinchazón del haz</i> | Media |
| <i>Perfil en sección transversal</i> | Plano-alabeado |
| <i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i> | Profundidad superficial con lóbulos cerrados-ligeramente superpuestos |
| <i>Pigmentación del haz</i> | Ausente o muy débil |
| <i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i> | Nula o muy baja |
| <i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i> | Media |
| <i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i> | Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados |
| <i>Forma y longitud de dientes</i> | Dientes con ambos lados convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura pequeña |



Sylvaner



Racimo:

| | |
|---------------------------|-----------|
| <i>Tamaño</i> | Pequeño |
| <i>Compacidad</i> | Compacto |
| <i>Longitud pedúnculo</i> | Muy corto |

Baya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Tamaño</i> | Pequeña |
| <i>Uniformidad tamaño</i> | Uniforme |
| <i>Color Epidermis</i> | Verde-amarilla |
| <i>Forma de perfil</i> | Circular-acuminada |
| <i>Separación pedicelo</i> | Difícil |
| <i>Grosor piel</i> | Media |
| <i>Pigmentación pulpa</i> | Ausente o muy débil |
| <i>Consistencia pulpa</i> | Blanda |
| <i>Suculencia pulpa</i> | Muy jugosa |
| <i>Sabores particulares</i> | Ninguno |
| <i>Formación pepitas</i> | Bien formada |

Sarmiento:

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>Color</i> | Marrón oscuro |
| <i>Relieve superficie</i> | Estriada |

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Exigente en cuanto a suelos (sensible a clorosis)
- Rendimiento regular (constante). A veces presenta dificultad de agostamiento.
- Sensible a heladas primaverales.
- Muy sensible a botrytis, oídio y mildiu.

Potencial enológico:

- Vinos ligeros, afrutados, muy ácidos, relativamente neutros.
- Con un rendimiento bajo, una buena añada y un suelo apropiado se elaboran vinos aromáticos.
- También se elaboran con esta variedad vinos licorosos de vendimia tardía.
- Su área más importante de cultivo es Alemania.