

Treixadura



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Media sobre nervios
--------------------------------	--

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
--	---------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Plano-bordes hacia el envés
--------------------------------------	-----------------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad muy superficial con lóbulos cerrados
---	--


<i>Pigmentación del haz</i>	Media
-----------------------------	-------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja-baja
--	----------------------


<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
---	------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud anchura mediana
------------------------------------	--



Treixadura



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Medio-grande
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarilla
<i>Forma de perfil</i>	elíptica corta
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa-muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media-tardía

Época de maduración: media-tardía

Aptitudes agronómicas:

- Vigor fuerte, de fertilidad media. Porte entre horizontal y semirrastrero.
- Poda larga, necesita formación con presencia de madera vieja.
- Producción alta.
- Sensibilidad moderada al oídio y mildiu. Sensible a la borytis y excoiasis.

Potencial enológico:

- Exclusivamente de vinificación, con rendimiento medio-alto da vinos desequilibrados.
- Vinos complementarios, graduación alcohólica media-alta y acidez total media-baja. Se utiliza con el Albariño por su aroma delicado y poco acentuado, sabor varietal.
- Calidad enológica: muy buena

