

# Xarello

Sinonimias: Cartoixa. Pansa blanca. Pansal. Xarel.lo.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-alta Densidad alta

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en nudos Baja en el entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales* Nula o muy débil

*Densidad pelos tumbados* Densa entre nervios  
Media sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Grande-muy grande

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Poco abierto-ligeramente superpuestos

*Hinchazón del haz* Medio

*Perfil en sección transversal* Bordes hacia el envés

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad superficial con lóbulos abiertos



*Pigmentación del haz* Ausente o muy débil

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Baja

*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo ligeramente más corto que el nervio central, con densidad baja

*Forma y longitud de dientes* Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana



# Xarello



## Racimo:

Tamaño	Mediano
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

## Baya:

Tamaño	Media
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde amarilla
Forma de perfil	Circular
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Ligeramente dura
Suculencia pulpa	Ligeramente jugosa-muy jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formadas

## Sarmiento:

Color	Marrón oscuro
Relieve superficie	Estrizada

## Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media

## Aptitudes agronómicas:

- Variedad rústica de mediano vigor. Se adapta bien a todos los suelos.
- Yemas de la base poco productivas. Se recomienda poda larga.
- Sensible al corrimiento. Productividad buena con condiciones climáticas favorables durante la floración.
- Sensible al oídio, mildiu, ácaros y polillas del racimo. Poco sensible a botrytis.

## Potencial enológico:

- Mostos de elevada acidez, con un contenido en azúcares medio-alto, muy apreciado en la elaboración de cavas, consistente y equilibrado.

