

Zalema



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
----------------------------	---------

<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad débil-media
---	--

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Baja en el entrenudo
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Media-fuerte
---	--------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Débil
--------------------------------	-------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Media-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Ligeramente superpuestos en V
--	-------------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Entre nula y débil
--------------------------	--------------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	En canal
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media-profunda con lóbulos superpuestos
---	---


<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
--	-----------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
---	-----------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Muy corto Nula o muy baja
--	------------------------------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud anchura media
------------------------------------	---



Zalema



Racimo:

Tamaño	Mediano
Compacidad	Muy compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde-amarilla
Forma de perfil	Aplanada
Separación pedicelo	Muy difícil
Grosor piel	Mediana
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón amarillento
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de comienzo de envero: tardía

Aptitudes agronómicas:

- Planta vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad elevada. Productiva, racimos muy grandes.
- Muy resistentes a sequía, se adapta a terrenos poco fértiles. Se pueden aplicar podas muy cortas con producciones aceptables.
- Algo sensible a botrytis.

Potencial enológico:

- Vinos poco alcohólicos, de color amarillo pálido, poco aromáticos, acidez media-alta, vinos muy ligeros en boca que dejan un ligero tono amargo.
- Su vocación es ser empleada para la elaboración de vinos generosos, aunque no alcanza la nobleza de la variedad Palomino. Actualmente se está empleando en la elaboración de vinos jóvenes de muy poca graduación y acidez media-alta que resultan agradables al paladar.

